



台湾で流行性髄膜炎 1 例を確認

呼吸器の衛生に注意し疑わしい症状が現れたら速やかに医療機関受診を！

衛生福利部 www.mohw.gov.tw 2025-08-12 來源: 疾病管制署

疾病管制署（以下「疾管署」）は本日（8月12日）、「髄膜炎菌性髄膜炎の新たな本土症例 1 例が確認されたが、患者は台湾南部出身の 70 代男性で、がんや慢性閉塞性肺疾患などの慢性疾患の既往歴があったが、海外渡航歴はなく、今年7月25日に喘息のため入院し、8月3日、突然の意識障害と血中酸素濃度が低下し、当日死亡した。その後、病院からの報告並びに検査の結果、髄膜炎菌性髄膜炎に罹患していたことが確認された。関連の接触者は既に全て衛生教育及び健康観察がなされており、医師の評価により検体検査或いは予防薬投与がなされている」と発表した。

疾管署は、その監視データから今年台湾で確認された流行性脳脊髄膜炎患者は 6 例となっている。2016 ~2024 年までの統計では、例年の発症者数は 1~12 人の範囲であり、症例の感染年齢は 25~64 歳（30%）であり、これに 19~24 歳および 65 歳以上（それぞれ 23%）が次ぐ。症例には髄膜炎菌 B 型への感染が常見されるとしている。

疾管署は「流行性髄膜炎は、主に感染者或いは保菌者の喉や鼻からの分泌物や飛沫との接触によって伝染する、濃厚接触或いは長時間の接触によってのみ有効に伝染するが、健康な人でも無症状の鼻咽頭保菌者が存在することがあるが、そのうちごく少数に侵襲性疾患を発症することがあり、免疫力の低下している人は感染しやすく、潜伏期間は約 2~10 日、主な症状は発熱や激しい頭痛、頸部のこわばり、恶心、嘔吐、出血性皮疹などであり、時に昏睡やせん妄が起こることもある。重症の場合には肺炎や敗血症、髄膜炎さらにはショックや死に至ることもあり、適切なタイミングでの抗生素治療が必要となる。

疾管署は、「流行性髄膜炎への感染リスクを軽減するために、混雑した環境や換気の悪い環境に長時間さらされることを避けるとともに、手指と呼吸器の衛生状態を良好に保つこと；疑わしい症状が現れた場合、症状の悪化を防ぐため、直ちに病院の受診を」と注意喚起している。

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/6yJwC_NphW8Kr0mp5pzqGQ?typeid=9

**Taiwan added a new confirmed case of epidemic cerebrospinal meningitis.
Pay attention to respiratory hygiene and seek medical treatment ASAP if you have suspected symptoms.**

Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw 2025-08-12 Source: Department of Disease Control

The Centers for Disease Control (CDC) announced today (August 12) that one new local case of meningococcal meningitis has been confirmed. The case, a man in his 70s from southern Taiwan, had a history of chronic illnesses including cancer and chronic obstructive pulmonary disease, but no international travel history. and was hospitalized for asthma on July 25th of this year. On August 3rd, he suddenly experienced a change in consciousness and a drop in his blood oxygen level. He died on the same day and was later reported to the hospital and confirmed to have been infected with epidemic cerebrospinal meningitis. All relevant contacts have been arranged for health education and health monitoring, and doctors have assessed whether to take tests or preventive medications.

The CDC explained that according to the CDC's monitoring data, there has been a total of 6 confirmed cases of epidemic meningitis in Taiwan this year. Statistics from 2016 to 2024 showed that the cumulative number of cases each year was between 1 and 12 cases. The majority of infected individuals were aged 25-64 (accounting for 30%), followed by 19-24 and over 65 (each accounting for 23%). The most common cases are infected with Neisseria meningitidis type B.

The CDC stated that epidemic meningitis is primarily transmitted through contact with throat and nasal secretions or droplets from an infected or carrier person. Effective transmission requires close or prolonged contact. Healthy individuals may present asymptomatic carriers of the bacteria in the nasopharynx, with only a small number of carriers developing invasive disease. Immunocompromised individuals are more susceptible to the disease, with an incubation period of approximately 2 to 10 days. The main symptoms include fever, severe headache, neck stiffness, nausea, vomiting, hemorrhagic rash, and sometimes coma and delirium. Severe cases can cause pneumonia, sepsis, meningitis, and even shock and death, requiring prompt antibiotic treatment.

The CDC reminds that to prevent epidemic cerebrospinal meningitis, you should avoid staying in crowded or poorly ventilated environments for long periods of time, and maintain good hand and respiratory hygiene to reduce the chance of infection; If you have suspected symptoms, you should seek medical treatment as soon as possible to avoid worsening of the condition.

:::::::::: 以下は中国語原文 ::::::::::::

國內新增 1 例流行性腦脊髓膜炎確定病例，籲請民眾注意呼吸道衛生，出現疑似症狀應儘速就醫

衛生福利部 www.mohw.gov.tw 2025-08-12 來源： 疾病管制署

疾病管制署(下稱疾管署)今(12)日公布新增1例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，為南部70多歲男性，有癌症及慢性阻塞性肺病等慢性疾病史，無國外旅遊史，於今年7月25日因呼吸喘住院治療，8月3日突然意識改變，血氧濃度降低，於當日死亡，後經醫院通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，相關接觸者皆已安排衛教及健康監測，並由醫師評估是否採檢或預防性投藥。

疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計6例流行性腦脊髓膜炎確定病例。2016年至2024年統計資料顯示，每年累計病例數介於1-12例，個案感染年齡以25-64歲為多(占30%)，其次為19-24歲及65歲以上(各占23%)，病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2~10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

疾管署提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；如出現疑似症狀，應儘速就醫，避免病情惡化。

20250812F 台湾で流行性髄膜炎 1 例を確認(衛生福利部)